

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

**ENFERMEIRO
PSF**

TURNO: MANHÃ

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os **15 minutos** iniciais.
2. A prova consistirá de **40 questões** com **quatro** alternativas (**A, B, C, D**) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
3. O candidato somente poderá levar o **Caderno de Questões** caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.
4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
5. 5.3.1. A **prova objetiva** será realizada na cidade de **Paulistana (PI)**, no dia **08.11.2015** e terá a duração de **03 (três) horas** para todos os cargos. No horário de **09h00 (nove horas) às 12h00 (doze horas)** serão aplicadas as provas para os cargos de nível médio, superior e professor e no horário das **14h00min (quatorze horas) às 17h00min (dezessete horas)** as provas para os cargos de nível fundamental.
6. Reserve os **30 (trinta) minutos** finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

NOME DO CANDIDATO:

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 3303-3146

RASCUNHO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTANA - PI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

QUESTÃO 01

Considerando as características da língua culta formal, analise os itens a seguir:

I - Depende do grau de conhecimento do receptor para decodificá-la, com isso, a mensagem é transmitida da forma não imediata, por ser mais longa e complexa do que na língua falada.

II - No texto, a ausência do emissor faz com que alguns receptores não reconheçam imediata e claramente a intenção do código.

III - Alguns textos requerem do receptor um nível de compreensão do código acima da média, sobretudo em contextos informativos, didáticos, científicos, literários ou jurídicos.

IV - Fazem-se exigências de construções sintáticas complexas com elaboração de frases subordinadas e coordenadas de maneira lógica e coerente, além de correção vocabular e conhecimento médio do léxico.

Quantos itens estão corretos?

- A) um
- B) dois
- C) três
- D) quatro

QUESTÃO 02

Considerando as tipicidades da língua falada, assinale a alternativa correta:

- A) Dialeto: Língua própria de indivíduos de certa região. Sua ocorrência é comum em países de dimensões continentais – como Brasil, Rússia ou Estados Unidos – e que oferecem variáveis ao uso do idioma pátrio.
- B) Regionalismo: Constitui uma língua menor dentro de outra, maior. Pode-se defini-lo como uma forma local própria de comunicação a partir da qual se constitui uma língua de união.
- C) Sotaque: Hábito articulatório do aparelho fonador, realizado por entonações próprias, que confere certa identificação peculiar à fala de um indivíduo.
- D) Gíria: Língua usada pelos mais baixos extratos sociais, especialmente por párias e malandros. Desprovidos dos conceitos que formatam as normas gramaticais, os usuários criam distorções, termos chulos, vulgares para ilustrarem *status quo*: o abandono a que estão destinados. Embora seja fenômeno ligado ao grupo social desassistido, falantes de outros grupos sociais dela também fazem uso.

QUESTÃO 03

Identifique a alternativa em que a frase está no sentido denotativo:

- A) Há dias que amanhecem noite.
- B) Seus olhos eram luzes brilhantes.
- C) O Sol é a estrela responsável pela vida na Terra.
- D) Meu pensamento é um rio subterrâneo.

QUESTÃO 04

Marque a opção em que o termo ONDE, AONDE ou DONDE é classificado como PRONOME RELATIVO:

- A) Meu coração, aonde a ida não é nada fácil, abriu-lhe a guarda.
- B) Donde você saiu para chegar aonde se encontra?
- C) Estou onde quero no relacionamento.
- D) A cidade donde venho é muito tradicional.

QUESTÃO 05

Considerando as características principais da DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA, analise os itens:

I - Presença de uma estrutura linear facultativa, desde que possua uma ideia principal e estratégias argumentativas.

II - Privilegiam-se as estruturas impessoais, com certas modalizações discursivas em vez de juízos de valor ou sentimentos exaltados.

III - Há uma liberdade literária, deve haver um desenvolvimento coerente da ideia principal, mas a progressão temática é livre.

IV - Constitui-se de linguagem cuidada, com estruturas lexicais e sintáticas claras, simples e adequadas ao registro culto.

Quantos itens estão corretos?

- A) um
- B) dois
- C) três
- D) quatro



QUESTÃO 06

Em qual alternativa não se fez a correta reescritura da frase “O bom João da Silva, ensandecido, agrediu a assustada sogra, a Raimunda”?

- A) Ensandecido, o bom João da Silva, agrediu a assustada sogra, a Raimunda.
- B) A assustada sogra, a Raimunda, foi agredida pelo bom João da Silva, ensandecido.
- C) Pelo bom João da Silva, que estava ensandecido, foi agredida a assustada sogra, a Raimunda.
- D) Ensandecido, o bom João da Silva, agrediu a Raimunda, a assustada sogra.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo destacado é um exemplo de CIRCUNFIXAÇÃO:

- A) Viralização é um termo oriundo da internet.
- B) A companhia elétrica descobriu um gato na casa do vizinho.
- C) A arquibancada do sambódromo estava lotada.
- D) O novo edifício possui estacionamento subterrâneo.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que há correspondência entre as colunas quanto à classificação das orações coordenadas sindéticas:

1	Aditiva	Venha logo, pois tenho fome.
2	Adversativa	O menino não sossega, ou geme ou ri.
3	Alternativa	Ele é teu pai, respeita-lhe a vontade, pois.
4	Conclusiva	Não gosto de doce nem gosto de salgado.
5	Explicativa	Telefonei, mas a linha estava ocupada.

- A) 4 - 3 - 5 - 2 - 1
- B) 5 - 3 - 4 - 1 - 2
- C) 5 - 2 - 4 - 1 - 3
- D) 4 - 2 - 3 - 1 - 5

QUESTÃO 09

Marque a opção em que o termo destacado é uma forma linguística independente da estrutura sintática da frase:

- A) Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta.
- B) Ó máquina, orai por nós!
- C) A revolução causou muitas mortes, fato lamentável.
- D) O poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções.

QUESTÃO 10

Marque a alternativa que não é exemplo de coesão referencial.

- A) Minha tia comprou um Ford Ka. Eu também estou querendo um.
- B) Maradona anunciou a saída dos campos num clima de grande emoção. Ele ainda afirmou que continuará no meio futebolístico.
- C) Realizara todos os seus sonhos, menos este: o de ser escritora.
- D) O exercício que o mestre passou é igual ao de ontem.

QUESTÃO 11

Sobre coesão textual, julgue os itens (V ou F) e marque a opção correta.

- I - Coesão é a ligação entre as partes do texto (palavras, expressões, frases, parágrafos) por meio de determinados elementos linguísticos.
- II - É a relação sintática que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido.
- III - A coesão referencial ocorre quando usamos as classes gramaticais para recuperar certos termos dentro do texto.
- IV - Coesão recorrencial ocorre quando se usam conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas ou pronomes relativos que normalmente conectam orações dentro do texto.

- A) V, V, V, V
- B) F, F, F, F
- C) V, F, V, F
- D) F, V, F, V

QUESTÃO 12

Quanto à concordância verbal, marque a opção INCORRETA:

- A) Havia sérios problemas na cidade.
- B) Vão fazer quinze anos que ele parou de estudar.
- C) Visto serem dez horas, deixei o local.
- D) Nós lutaremos até vós serdes bem tratados pela sociedade.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa em que o termo destacado é PREDICATIVO DO SUJEITO:

- A) É primordial que aprendamos literatura.
- B) Deixei-a preocupadíssima.
- C) O povo elegeu-o presidente pela segunda vez.
- D) Gosto de vocês quietinhos.

QUESTÃO 14

Aponte a classificação correta da seguinte oração: “Como o silêncio se prolongasse, Isabel resolveu rompê-lo.”.

- A) Oração subordinada adjetiva explicativa
- B) Oração subordinada adverbial explicativa
- C) Oração subordinada adverbial causal
- D) Oração subordinada adverbial temporal

QUESTÃO 15

Todas as orações a seguir são subordinadas substantivas, EXCETO:

- A) Não sei se poderei sair hoje à noite.
- B) Aguardamos que você nos visite.
- C) Os funcionários que fizeram greve foram exonerados.
- D) Meu desejo é que você seja feliz.



INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

Relativamente ao aplicativo E-mail e seus atalhos no sistema operacional Microsoft Windows 8 assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) CTRL + R para responder
- B) CTRL + F para avançar
- C) CTRL + U para marca como lida
- D) CTRL + A para selecionar todas as mensagens

QUESTÃO 17

No que toca a aplicativo Microsoft PowerPoint assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) ALT+SHIFT+SETA PARA A ESQUERDA → promover um parágrafo.
- B) ALT+SHIFT+1 → exibir o título de nível 1
- C) ALT+SHIFT+SINAL DE ADIÇÃO → expandir o texto abaixo de um título
- D) ALT+SHIFT+SETA PARA BAIXO → rebaixar um parágrafo.

QUESTÃO 18

Em relação aos atalhos gerais do pacote de aplicativos Microsoft Office responda corretamente:

- A) Mover para um painel de tarefas de outro painel na janela do programa (sentido anti-horário) → SHIFT + F6
- B) Mover para um painel de tarefas de outro painel na janela do programa (sentido anti-horário) → CTRL + F10
- C) Quando mais de uma janela estiver aberta, alternar para a próxima janela → CTRL + F6
- D) Maximizar ou restaurar a janela selecionada → ALT + PRINT SCREEN

QUESTÃO 19

No aplicativo Microsoft Excel qual a função desempenhada pelo atalho CTRL + SHIFT + ~ ?

- A) Aplica o contorno às células selecionadas.
- B) Aplica o formato de número geral.
- C) Aplica o formato Data com dia, mês e ano.
- D) Insere a hora atual.

QUESTÃO 20

Considerando as teclas de funções existentes no sistema operacional Microsoft Windows 8, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A tecla F1 mostra a ajuda.
- B) A tecla F2 renomeia o item selecionado.
- C) A tecla F3 procura um arquivo ou pasta
- D) A tecla F4 atualiza a janela ativa.

ÁREA LIVRE



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Segundo o código de Deontológico do Enfermeiro, no que concerne ao Artigo 85º sobre Dever de sigilo, o enfermeiro, obrigado a guardar segredo profissional sobre o que toma conhecimento no exercício da sua profissão, assume o dever de:

- A) Considerar confidencial toda a informação acerca do destinatário de cuidados e da família, qualquer que seja a fonte.
- B) Partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico, usando como critérios orientadores: o bem-estar, a segurança física, emocional e social do indivíduo e família, assim como os seus direitos.
- C) Manter o anonimato da pessoa sempre que o seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou controle da qualidade de cuidados.
- D) Resguardar informações confidenciais acerca do indivíduo e família, incluindo nas situações previstas na lei, devendo, para tal efeito, justificar o sigilo mediante regimento do conselho deontológico e jurídico responsável.

QUESTÃO 22

Diante do caso da Srta. F.M.A., menor de idade, que deu entrada na maternidade de pequeno porte do seu município para realizar um aborto de feto anencefálico, julgue de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem as assertivas abaixo:

- I. O enfermeiro pode, nesse caso, negar assistência de enfermagem, assim como em qualquer situação de urgência e emergência;
- II. O enfermeiro deve executar ou participar da assistência à saúde, nesse caso, sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal mesmo este não sendo um caso de risco iminente de morte;
- III. Neste caso, como nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo.

A alternativa o item que contem as assertivas **CORRETAS**:

- A) Nenhuma assertiva está correta
- B) I e III
- C) II e III
- D) Apenas a III

QUESTÃO 23

Rouquayrol (2013) define medidas de saúde coletiva como sendo um termo composto por duas aplicações: uma para identificar as próprias medidas de vida e de saúde de uma população tomadas coletivamente e a outra para identificar a categoria dos profissionais que fazem a saúde coletiva, assim refletem em índices, taxas, coeficientes e indicadores de saúde da população em geral. Com base em tais conhecimentos assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Os indicadores de morbidade, sendo a morbidade o comportamento das doenças e agravos à vida em uma população exposta, têm como característica fundamental o fato de serem utilizados, preferencialmente, para avaliação do nível de saúde e aconselhamento de ações de caráter abrangente que visem melhorar o estado sanitário da comunidade.
- B) Os índices de prevalência denotam a frequência de casos de morbidade ou outra condição qualquer sobre eventos de saúde ou não doença. Assim, em saúde coletiva, prevalência refere-se à força com que subsistem as doenças nas comunidades.
- C) Incidência, em saúde coletiva, traduz a ideia da intensidade com a qual uma morbidade incide, em casos novos e subsistentes, sobre uma população em um intervalo de tempo.
- D) A preocupação em conhecer as causas e os meios de evitar a doença e a morte reflete no aprimoramento das estatísticas de mortalidade (coeficientes de mortalidade geral, infantil e a razão de mortalidade materna, por exemplo). Estas estatísticas integradas às estatísticas de saúde permitem que gestores e profissionais das diversas áreas de conhecimento possam diagnosticar situações de saúde iniciais, planejar e desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos.



QUESTÃO 24

A tuberculose é um problema de saúde pública prioritário no Brasil. Este agravo atinge a todos os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos e do sexo masculino. O método diagnóstico prioritário na atenção básica, que permite identificar o doente bacilífero é:

- A) Prova tuberculínica, conhecido como teste PPD, por utilizar a tuberculina PPD RT23 (componente proteico do bacilo) como meio para o diagnóstico da tuberculose, quando positivo o teste confirma o diagnóstico da doença.
- B) Baciloscopia direta do escarro, indicada para todos os doentes sintomáticos respiratórios (indivíduos com tosse e expectoração por três semanas ou mais), além daqueles que apresentarem alterações pulmonares na radiografia de tórax e contatos do paciente.
- C) Cultura de escarro ou outras secreções, indicada para suspeitos de tuberculose pulmonar, positivos ao exame do escarro, sendo a cultura o método mais preciso para identificação das formas de tuberculose extrapulmonares.
- D) Exame de tomografia computadorizada do tórax, método diagnóstico notadamente útil, principalmente nos casos em que a radiografia de tórax apresenta resultados imprecisos, por alterações parenquimatosas mínimas ou por não permitir distinguir lesões antigas das lesões da Tuberculose ativa.

QUESTÃO 25

As hepatites virais são doenças agudas, de manifestações clínicas variadas que vão desde formas subclínicas, oligossintomáticas até as formas fulminantes (menos de 8% dos casos). O diagnóstico das formas de hepatites virais pode ser clínico-laboratorial e o diagnóstico diferencial realizado mediante a sorologia. No paciente com hepatite C, seria comum encontrar os seguintes resultados nos exames laboratoriais, **EXCETO**:

- A) Dosagens de aminotransferases (ALT/TGP e AST/TGO) sanguíneas diminuídas, denunciando lesão no parênquima hepático.
- B) O nível de AST pode encontrar-se maior que o normal.
- C) As bilirrubinas são elevadas e o tempo de protrombina pode estar alargado (TP > 17s), indicando gravidade.
- D) Reação pelo marcador anti-HCV positiva, que indica contato prévio com o agente e HCV-RNA, que confirma a presença do vírus.

QUESTÃO 26

A sífilis é uma doença transmissível por via sexual, que também pode assumir caráter congênito. A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do *Treponema pallidum*, da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu conceito, por via transplacentária. Nesse sentido, a gestante que dá início ao pré-natal, na rede de atenção básica ou unidade de saúde, deve receber os seguintes cuidados para prevenção e/ou tratamento da sífilis congênita, **EXCETO**:

- A) Realizar o diagnóstico precoce de sífilis materna durante o pré-natal mediante: realização do VDRL na primeira consulta, idealmente no primeiro trimestre de gravidez e no início do terceiro trimestre.
- B) Enfocar a promoção em saúde por meio de ações de informação, educação e comunicação para as questões relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis, em geral, incluindo especificamente a sífilis e a prática do sexo protegido.
- C) Realizar tratamento imediato da mulher e seu parceiro no caso de confirmação do diagnóstico da gestante, de acordo com o esquema independente da fase da doença. Em caso de sífilis primária, secundária ou terciária uma dose de 1.200.000UI de penicilina G benzatina deve ser aplicada em cada glúteo, com intervalos semanais, até completar a dose total 4.800.000.UI.
- D) Tratar a gestante com eritromicina 500mg, via oral, de 6 em 6 horas durante 15 dias ou 30 dias, para sífilis recente ou tardia, respectivamente, caso seja confirmado o diagnóstico de sífilis materna e esta tenha alergia à penicilina mesmo após teste de sensibilidade. Nestes casos, a gestante não será considerada adequadamente tratada para fins de transmissão da sífilis congênita, sendo obrigatória a investigação e tratamento da criança logo após seu nascimento.

QUESTÃO 27

Na atenção básica, várias ações são realizadas no domicílio, como o cadastramento, a busca ativa, ações de vigilância e de educação em saúde. A atenção domiciliar estende ainda suas ações, quando realizadas isoladamente, a cuidados destinados aos pacientes com impossibilidade/dificuldade de locomoção até a Unidade Básica de Saúde/Estratégia Saúde da Família, por apresentarem algum agravo que demande acompanhamento permanente ou por período limitado (Ministério da Saúde, 2012). Nesse sentido, a equipe deve respeitar o espaço familiar e, ainda, trabalhar conjuntamente na promoção do ambiente favorável para a realização dos cuidados com a família e, principalmente, a figura do cuidador. A esse último integrante, o cuidador, compete as seguintes atribuições, **EXCETO**:

- A) Participar do tratamento diretamente observado (TDO).
- B) Realizar mudança de decúbito e massagem de conforto.
- C) Administrar medicações, incluindo em vias parenterais, após treinamento pela equipe de saúde e conforme prescrição.
- D) Atuar nos cuidados de higiene, estímulo à alimentação e suporte psicológico para com a pessoa cuidada.

**QUESTÃO 28**

Segundo as diretrizes de Atenção Domiciliar (Ministério da Saúde, 2012). No papel da gestão ou coordenação de atenção domiciliar destacam-se algumas atribuições, tais como:

- I. Apoiar as equipes de AD na organização do processo de trabalho e na discussão/resolução de conflitos e impasses;
- II. Garantir a discussão periódica dos casos clínicos/situações mais complexas e relevantes para análise do processo de trabalho das equipes e organização do SAD.
- III. Providenciar as escalas e controles de visitas que propiciem olhar sistêmico e integral a todos os pacientes em acompanhamento, dentro do atendimento multiprofissional.

Assinale o item que contém o **número de alternativas verdadeiras**:

- A) Nenhum
- B) Um
- C) Dois
- D) Três

QUESTÃO 29

João, de 2 anos, é trazido pela mãe Maria, para um atendimento em Unidade Básica de Saúde, pois havia sofrido um acidente doméstico: queimou a ponta dos dedos ao encostar-se a uma panela quente. A criança chorou bastante durante o início da consulta, mas acalmou-se sozinha e permaneceu em um canto, sem estabelecer contato algum com quem quer que fosse, mas também não parecia assustada ou intimidada. A mãe reclamava bastante dos problemas de sua família e já no final da consulta pediu um “exame de ouvido” e um “eletro da cabeça”, pois achava que seu filho João não escutava bem e estaria meio “atrasadinho”. Relatou “ele não responde quando eu chamo pelo nome” e, ainda, “não fala, mas o primo foi igualzinho, depois de muita promessa é que desandou a falar...”. A mãe pegou João sem cuidado algum e continuou contando os casos para a Enfermeira, que reparou que a criança em nenhum momento fez contato visual com qualquer pessoa da unidade. Antes de ir embora, a mãe ressaltou que já estava na época das matrículas escolares, porém não iria matricular João, pois “o que ele precisa agora é de um eletro da cabeça, sem isso não adiante escola, não vai aprender nada”.

(Caso João - adaptado.)

BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderno de Saúde Mental**. Caderno nº34. Ministério da Saúde. 2012.

A Enfermeira olhou João, que permanecia estático, e há mais de meia hora compenetrado em olhar para um cata-vento que estava sobre a mesa, tentou contato verbal e visual com o menino sem sucesso. Então, levantou a hipótese de que João poderia ter _____ e seu caso necessitaria ser encaminhado a uma rede de cuidados integrados da atenção básica para discussão, incluindo principalmente o _____. Marque a alternativa que contém a resposta que preenche **CORRETAMENTE** as lacunas:

- A) Transtorno do neurodesenvolvimento - Centro de Atenção Psicossocial – Caps i.
- B) Autismo – Fonoaudiólogo.
- C) TDAH – Neurologista.
- D) Atraso do desenvolvimento infantil – Pediatra.

QUESTÃO 30

Segundo o Calendário atualizado do Programa Nacional de Imunizações – PNI (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). As vacinas que a criança, com esquema vacinal atualizado, deverá tomar aos dois, quatro e seis meses de vida são, respectivamente:

- A) Aos dois meses: penta, VIP, rotavírus e pneumocócica 10V; Aos quatro meses: penta, VIP, rotavírus e pneumocócica 10V; Aos seis meses: penta, VOP e pneumocócica 10V.
- B) Aos dois meses: penta, VOP, rotavírus e pneumocócica 10V; Aos quatro meses: penta, VIP, rotavírus e pneumocócica 10V; Aos seis meses: penta, VIP, rotavírus e pneumocócica 10V.
- C) Aos dois meses: penta, VIP, rotavírus e meningocócica C; Aos quatro meses: penta, VIP, rotavírus e meningocócica C; Aos seis meses: penta, VIP, rotavírus e meningocócica C.
- D) Aos dois meses: penta, VOP, rotavírus e hepatite B; Aos quatro meses: penta, VOP, rotavírus e hepatite B; Aos seis meses: penta, VIP, rotavírus e hepatite B.

QUESTÃO 31

A respeito do Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações, proposto pelo Ministério da Saúde do Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A vacina contra febre amarela deve ser administrada na criança a partir dos 9 meses, em dose única e reforço a cada dez anos. É contraindicada para crianças menores de seis meses.
- B) A vacina contra o HPV (papiloma vírus humano) é disponibilizada pela rede SUS para a população alvo de 11 a 13 anos (2015) e a partir dos 10 anos (2016) de idade e deve ser administrada em três doses com intervalos de seis meses entre elas, aos 0, 6 e 12 meses.
- C) A vacina BCG deve ser administrada o mais cedo possível, de preferência na maternidade, em dose única, via intradérmica. Recomenda-se adiar a vacinação para crianças prematuras com peso inferior a 2kg. Contraindicada para indivíduos a partir de cinco anos portadores de HIV.
- D) A vacina penta protege a criança contra até cinco doenças (Dtp+ HepB+HB), indicada a iniciar o esquema a partir dos dois meses de idade, sendo três doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas e duas doses de reforço para DTP.

**QUESTÃO 32**

O desenvolvimento das principais ações propostas pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) se dá por meio dos ACS, pessoas escolhidas dentro da própria comunidade para atuarem junto à população. O ACS deverá atender entre 400 e 750 pessoas, dependendo das necessidades locais, e desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão, tais como:

Visitar no mínimo uma vez por mês cada família da sua comunidade;
 Supervisionar eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas;
 Pesquisar e medir mensalmente as crianças menores de dois anos e registrar a informação no Cartão da Criança;
 Identificar as gestantes e encaminhá-las ao pré-natal.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- A) II e III
- B) I, II e III
- C) II, III e IV
- D) I, II, III e IV

QUESTÃO 33

O Programa de Saúde da Família – PSF, instituído em 1994, atualmente Estratégia Saúde da Família, tem como objetivo geral “contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com definição de responsabilidade entre os serviços de saúde e a população” (BRASIL, 1997). São diretrizes operacionais do PSF, **EXCETO**:

- A) Assumir caráter substitutivo, complementariedade e hierarquização dentro do sistema único de saúde, no qual a Unidade de Saúde da Família caracteriza-se como porta de entrada do sistema local de saúde.
- B) Trabalhar com uma clientela adscrita, sob um território de abrangência definido, que significa a área sob sua responsabilidade.
- C) Realizar cadastramento das famílias por meio de demanda espontânea, através das consultas ambulatoriais eventuais e, posteriormente, programadas, segundo a definição da área territorial para adscrição.
- D) Ter equipe composta por, no mínimo, um médico de família ou generalista, enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Além desses, odontólogos, assistentes sociais e psicólogos, dentre outros, devem fazer parte tanto nessas equipes quanto nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

QUESTÃO 34

O Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988.

“A atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos. Em outras palavras, as necessidades de saúde das pessoas (ou de grupos) devem ser levadas em consideração mesmo que não sejam iguais às da maioria”.

OLIVEIRA, C.A.R. **Legislação do SUS. Evolução das políticas de saúde no Brasil**. 2ªed. Gráfica Lotus: Teresina, 2015.

Este conceito refere-se ao seguinte princípio ideológico e doutrinário do SUS:

- A) Universalidade
- B) Integralidade
- C) Equidade
- D) Controle Social

QUESTÃO 35

A Lei Orgânica N° 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde entre outras providências. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo e assinale com V (verdadeiro) ou F (falso).

- () A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada, exclusivamente, pelo Poder Executivo.
- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- () O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Marque a alternativa que compreende a sequência **CORRETA**:

- A) F, V, V, V
- B) F, V, F, V
- C) V, F, V, F
- D) V, F, F, V



QUESTÃO 36

O número total de compressões aplicadas durante a ressuscitação é um fator determinante e importante para sobrevivência em parada cardiorrespiratória. O número de compressões aplicadas é afetado pela frequência e pela fração da compressão, assim os aumentos na frequência e na fração da compressão elevam o total de compressões aplicadas, ao passo que reduções na frequência e na fração diminuem o total de compressões aplicadas. Nesse sentido, marque a alternativa **INCORRETA** sobre os principais pontos de discussão e alterações nas recomendações das Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE para os profissionais de saúde.

- A) Os atendentes/operadores devem instruir socorristas leigos não treinados a aplicar a RCP somente com as mãos em adultos com PCR súbita.
- B) O procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração” foi removido do algoritmo.
- C) O uso de pressão cricoide durante as ventilações, em geral, não é recomendado.
- D) O profissional da saúde não deve levar mais do que 15 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso em 15 segundos, deve iniciar a RCP e usar o DEA/DAE, se disponível.

QUESTÃO 37

O número de compressões torácicas aplicadas por minuto durante a RCP é um fator determinante importante do retorno da circulação espontânea e da sobrevivência com boa função neurológica. O número real das compressões torácicas aplicadas por minuto é determinado pela frequência das compressões torácicas e o número e a duração das interrupções nas compressões para, por exemplo, abrir a via aérea e aplicar ventilações de resgate. Sabendo disso, analise as afirmações abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) É sensato que os socorristas leigos e profissionais da saúde devam realizar aproximadamente 100 compressões torácicas a uma frequência mínima de 100 compressões por minuto.
- B) A aplicação de compressões torácicas adequadas exige ênfase não somente na frequência adequada de compressões, mas também em minimizar interrupções a este componente crítico da RCP.
- C) O esterno do adulto durante a compressão deverá ser comprimido em, no mínimo, 2 polegadas (5cm).
- D) As compressões torácicas podem ser iniciadas quase imediatamente, ao passo que posicionar a cabeça e obter um selo para a respiração boca a boca ou com bolsa-válvula-máscara/insuflador manual sempre demoram certo tempo, nesse sentido é indicado iniciar compressões torácicas antes das ventilações.

QUESTÃO 38

Os equipamentos de proteção individual (EPI), roupas ou equipamentos especializados usados por profissional de saúde para a proteção contra materiais infecciosos devem estar prontamente disponíveis para o pessoal que executa o atendimento ao cliente (CDC, 2004). No Brasil, para fins de aplicação, a NR 6 considera um EPI todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou importado, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente (CLT – artigo 166 inciso 6.3 subitem A – Artigo 167 inciso 6.2).

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – As luvas ajudam a prevenir a transmissão de patógenos pelo contato direto e indireto, assim a CDC alerta que você deverá calçar luvas limpas ao tocar em sangue, fluidos corporais, excreções como suor, secreções, pele não intacta e itens ou superfícies contaminadas.

PORQUE

II – A exposição a líquidos do corpo e a sangue, bem como o manuseio de muitos instrumentos cirúrgicos, constituem fatores que contribuem para falhas de luvas, como por exemplo, rasgões e cortes minúsculos, que ocorrem nas luvas, somente são observados após a retirada das mesmas.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são proposições falsas, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira, mas não é uma justificativa para a primeira.
- D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.

**QUESTÃO 39**

A realização de procedimentos estéreis assépticos requer uma área de trabalho na qual os objetos possam ser manuseados com mínimo risco de contaminação. Um campo esterilizado proporciona uma superfície estéril para a colocação de um material estéril, assim ao iniciar um procedimento que requer uma técnica estéril o(a) Enfermeiro(a) segue determinados princípios que garantem a manutenção da assepsia. Sabendo disso, analise as afirmações abaixo e marque a **alternativa que indica os itens incorretos**.

I - É imprescindível abrir embalagens estéreis sem contaminar o conteúdo. Itens que são embalados comercialmente são normalmente projetados para que você só tenha que rasgar ou separar o papel ou invólucro com a outra mão, tomando cuidado para manter o conteúdo interno estéril antes do uso.

II - A extremidade de um campo ou recipiente estéril é considerada contaminada pelo fato de a extremidade do campo tocar uma superfície não estéril, assim uma borda de 1,0 cm ao redor do campo é considerada contaminada.

III - Um objeto estéril ou campo torna-se contaminado por exposição mínima ao ar, já que existe a possibilidade de correntes de ar devido ao número de pessoas transitando pela área.

IV - Luvas estéreis são barreiras adicionais à transferência bacteriana, havendo dois métodos de colocação das luvas: aberto e fechado.

- A) I, II, IV
- B) II e IV
- C) II e III
- D) I e III

QUESTÃO 40

Segundo KROGER et al (2010), a perceptividade implica a resposta de mecanismos adquiridos pela aprendizagem e exige certo grau de interação cortical, e portanto, tem maior nível de complexidade. A reatividade independe da interação cortical e abrange mecanismos de reatividade inespecífica (induzida por mecanismos subcorticais), à dor (depende de estruturas localizadas no tronco cerebral) e vegetativa (ligada a manutenção das funções vegetativas). Para essa avaliação, utilizam-se estímulos verbais, ruídos produzidos e estímulos dolorosos, observando a melhor resposta apresentada pelo avaliado.

Nessa perspectiva, percebe-se a importância da utilização da Escala de Coma de Glasgow na avaliação neurológica, pois esta, considera três índices comportamentais de perceptividade e/ou reatividade: *abertura ocular, resposta verbal e resposta motora*. Diante disso assinale a alternativa **CORRETA** sobre a Escala de Coma de Glasgow.

- A) A Escala de Coma de Glasgow foi desenvolvida em 1974 na Universidade de Glasgow, Escócia, com a finalidade de avaliar pacientes com distúrbios neurológicos em unidades de terapia intensiva.
- B) Como a escala avalia a abertura ocular, resposta verbal e motora é importante ao usar a escala associar a avaliação do padrão respiratório, o diâmetro e a reatividade pupilar, os principais movimentos pupilares, reações gastrointestinais e respostas motoras.
- C) A variação de escores é de 4 a 16 pontos.
- D) A principal finalidade da Escala é minimizar a variação entre os observadores, permitindo estudos comparativos sobre diferentes condutas nos pacientes a ter um guia para estimar prognósticos.